

BIOBOS BTV 3 INIEKCYJNA ZAWIESINA

Inaktywowana szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka (Bluetongue serotyp BTV 3).

TYP PRODUKTU: Szczepionki

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Bydło, owce

Skład:

Każda dawka 1 ml zawiera:

- Inaktywowany wirus gorączki niebieskiego języka, serotyp 3 (szczep Bio-93: BTV3) 10–320 jednostek ELISA.*
- *Ilość antygeny określona metodą ilościową ELISA.*

Substancje pomocnicze:

- Wodorotlenek glinu: 2,25–2,75 mg
- Saponina Quill A: 0,2 mg

Wskazania:

Owce:

Aktywna immunizacja w celu redukcji wiremii i zapobiegania klinicznym objawom wywołanym wirusem choroby niebieskiego języka (Bluetongue virus, BTV), serotyp 3.

- **Początek odporności:** 3 tygodnie po szczepieniu pierwotnym.
- **Czas trwania odporności:** Nie określono.

Bydło:

Aktywna immunizacja w celu zapobiegania wiremii i klinicznym objawom wywołanym wirusem choroby niebieskiego języka (Bluetongue virus, BTV), serotyp 3.

- **Początek odporności:** 3 tygodnie po szczepieniu pierwotnym.
- **Czas trwania odporności:** Nie określono.

Specjalne ostrzeżenia:

- Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
- Szczepienia podstawowe należy przeprowadzić przed okresem ryzyka wystąpienia choroby, związanym z aktywnością głównych wektorów – muchówek.
- Wysoki poziom przeciwciał matczynych może negatywnie wpływać na rozwój odporności poszczepiennej. Przeciwciała te zwykle zanikają:
 - U jagniąt: Do 3 miesięcy życia.
 - U cieląt: Do 2,5 miesiąca życia.

Stosowanie u innych przeżuwaczy, zarówno hodowlanych, jak i dziko żyjących, powinno odbywać się ostrożnie. Przed masowym szczepieniem zaleca się przetestowanie szczepionki na niewielkiej liczbie zwierząt.

Stosowanie w czasie ciąży, laktacji lub produkcji jaj:

- **Ciąża:** Może być stosowana w czasie ciąży.

Dawkowanie i sposób podania:

- Stosować standardowe procedury aseptyczne.
- Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć (unikać tworzenia piany).
- Szczepionkę należy podgrzać do temperatury 15–25°C przed podaniem.
- Całą zawartość butelki zużyć natychmiast po otwarciu.

Dawkowanie:

- **Owce:** 1 ml podskórnice.
- **Bydło:** 1 ml domięśniowo.

Schemat szczepienia:

- **Owce:** Jedna dawka od 1 miesiąca życia u zwierząt naiwnych immunologicznie.
- **Bydło:**
 - Pierwsze szczepienie: Od 1 miesiąca życia.
 - Drugie szczepienie: 3 tygodnie po pierwszej dawce.
- **Dawki przypominające:** Nie określono.

Okres karencji:

Brak okresu karencji.

Okres trwałości:

- W zamkniętym opakowaniu: 2 lata.
- Po otwarciu: 10 godzin.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w temperaturze 2–8°C.
- Chronić przed mrozem i światłem.

Dostępne opakowania:

- Plastikowe opakowanie z 10 fiolkami (10 x 10 ml).
- Kartonowe opakowania o różnych pojemnościach:
 - 10 dawek (1 x 10 ml)
 - 50 dawek (1 x 50 ml)
 - 100 dawek (1 x 100 ml)

Nie wszystkie rozmiary opakowań mogą być dostępne na rynku.

Okoliczności wyjątkowe:

Szczepionka została zarejestrowana w wyjątkowych okolicznościach. Ocena opiera się na ograniczonych danych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.